



SECCIONES

SUSCRÍBETE X \$2700/3MESES

INTERMEDIOS

★ MIS NOTICIAS

VIDA | CIENCIA EDUCACIÓN VIAJAR MEDIO AMBIENTE MUJERES RELIGIÓN MASCOTAS

# Amazonía perdió 9,7 por ciento de su vegetación en los últimos 37 años

Una zona deforestada y quemada se ve en Humaitá, estado de Amazonas, Brasil. **FOTO:** MICHAEL DANTAS. AFP

Un periodo en el que los glaciares tropicales se redujeron en 46 por ciento, según un análisis.

**RELACIONADOS:** GLACIARES | AMAZONIA | VEGETACIÓN

Se

EFE

03 de diciembre 2022, 08:59 A. M.

Seguir  
Medio Ambiente

Comentar



Guardar



Reportar



Portada

La Amazonía perdió el 9,7 por ciento de su vegetación natural entre 1985 y 2021, un periodo en el que los glaciares tropicales se redujeron en 46 por ciento y la minería se expandió en más de un 1.100 por ciento en el pulmón verde del planeta, según datos revelados este viernes por la iniciativa Mapbiomas Amazonía.

Lea también: ('Colombia, definitivamente, se está posicionando como líder ambiental')

## Temas relacionados

MEDIOAMBIENTE NOV 28

La compensación por pérdidas y daños, tema clave del Gobierno en la COP27



NOTICIAS ET NOV 24

Pueblos indígenas del Amazonas reclaman a la Corte atención, ¿por qué?



Reciba noticias de EL TIEMPO desde GoogleNews

Hace 37 años, alrededor de **50 millones de hectáreas amazónicas** se habían transformado en áreas antrópicas, pero esta cifra escaló hasta alcanzar las 125 millones de hectáreas en 2021, lo que representa el 15 por ciento de todo el territorio amazónico y una pérdida neta de casi el 10 por ciento de vegetación natural.

La magnitud de esta destrucción, sin embargo, varía considerablemente de un país a otro, pues mientras **Surinam, Guyana y Guayana Francesa** perdieron alrededor del 1,6 por ciento de la cobertura boscosa amazónica, el porcentaje llega al 19 por ciento en el caso de Brasil.

Le puede interesar: [\(Región Caribe, una de las que más ha perdido su vegetación natural\)](#)

Así lo concluyen los datos recogidos en la **Colección 4.0 de MapBiomias Amazonía**, una iniciativa de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) que estudia los cambios en el uso del suelo en el bioma amazónico y las presiones sobre sus bosques y ecosistemas.

Durante la presentación de esta herramienta, el especialista del Instituto Socioambiental Cícero Cardoso precisó que el 99 por ciento de las 75 millones de hectáreas que se transformaron en áreas antrópicas en las últimas casi cuatro décadas correspondió al uso agropecuario y de silvicultura del suelo, mientras que "solamente el 1 por ciento respondió a la minería y a la infraestructura".

En Perú, detalló, el uso agropecuario aumentó en 50 por ciento en el periodo analizado, mientras que la actividad minera "representa 70,3 por ciento más la de 1985". A nivel regional, los glaciares de los Andes amazónicos, que abastecen de agua a millones de personas y alimentan los manantiales de los ríos, perdieron el 46 por ciento de su hielo, mientras que la actividad minera avanzó en 1.107 por ciento tras pasar de ocupar 47.000 hectáreas a más de 570.000.

Esta destrucción es **"prácticamente irreversible"** y las perspectivas para revertirla son casi nulas, alertan los autores del análisis, quienes destacan el contraste entre la acelerada dinámica de cambio de uso de suelo con la lentitud que caracteriza el ritmo de las negociaciones climáticas.

EFE

🔗 **'Lo que busca la UNGRD en Hidroituango es proteger la vida'**

🔗 **'El mundo está esperando que Colombia lidere en temas ambientales'**

🔗 **Los cinco departamentos más afectados por las lluvias en las últimas 24 horas**

¿Te gusta estar informado? Disfruta del mejor contenido sin límites. [Suscríbete aquí.](#)



03 de diciembre 2022, 08:59 A. M.

