

■ Calidris realizó estudio

Bahía Málaga, un santuario de aves



Foto: Archivo Diario Occidente

MEDIO AMBIENTE

Lunes 29 de Enero, 2024

Un informe sobre la distribución y abundancia de aves marinas y playeras en el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga en la costa Pacífica vallecaucana, hicieron investigadores de la Asociación Calidris.

El estudio se adelantó con el fin de aportar al conocimiento de las aves marinas y playeras en esta región.

Durante las actividades se registraron 16 especies y se contaron 1.718 individuos pertenecientes a seis familias.

Abundancia

Las especies más abundantes fueron el Chirón bullicioso (*Numenius phaeopus*, 450 individuos) y el pelicano pardo (*Pelecanus occidentalis*, 218 individuos).

También se detectaron 199 individuos de Playero Occidental

La mayor concentración de aves se detectó en los planos lodosos intermareales ubicados en la parte media e interna de la bahía, donde se registró aproximadamente el 58.9% de los individuos.

Recibe nuestras noticias en tu correo electrónico



DESTACADO

LO MÁS VISTO

LO MÁS RECIENTE



[sexual](#)

[Mujer habría fallecido mientras tenía relaciones por una insólita práctica](#)



[Aves Cali: conozca la finca adaptada para avistar pájaros](#)



[Atroz crimen: hombre cortó la cabeza de su ex esposa con un machete](#)



[Viralizan cédula de Amparo Grisales en las Redes Sociales](#)



[Güireo y chacaleo, un fenómeno que pone en la lupa a los jóvenes del oriente de Cali](#)



El informe indica además que los principales grupos de aves acuáticas fueron los chorlos y playeros, que comprendieron nueve especies y 999 individuos.

Por su parte, las aves marinas estuvieron representadas por siete especies y 719 individuos.

Actividad humana

En el 57% de los puntos, Calidris registró actividades de origen antrópico, siendo las más comunes, la pesca y recolección artesanal de moluscos con un 15%, además de la presencia de centros poblados cerca de las áreas de ocupación de las aves en un 8%.

Se resaltó en el estudio el valor ecosistémico de los planos intermareales y las áreas de manglar adyacentes como hábitats claves para aves marinas y playeras.

Por otra parte, los sitios de concentración importantes de las aves playeras fueron zonas de alimentación, los cuáles correspondieron a planos lodosos dentro de la bahía, con abundancias entre 151 y 200 individuos.

En cuanto a las aves marinas, los principales sitios de concentración fueron dos dormideros en islotes de manglar, siendo “Ultima Isla” y “Sacapeña” donde se registraron entre 51 y 200 individuos.

Las aves marinas y las aves playeras son dos categorías distintas de aves que comparten adaptaciones específicas para vivir en ambientes acuáticos, pero difieren en algunos aspectos.

Aves marinas

Las aves marinas pasan la mayor parte de su vida en alta mar, lejos de la costa. Están adaptadas para volar grandes distancias sobre el océano y son capaces de pasar días, e incluso semanas, en vuelo sin tocar tierra.

Suelen alimentarse de peces y otros organismos marinos. Algunas especies, como los albatros, tienen técnicas de vuelo especializadas para aprovechar las corrientes de aire sobre el océano y cubrir grandes distancias en busca de alimento.

Muchas aves marinas anidan en islas remotas o en acantilados costeros. Ejemplos incluyen albatros, petreles y cormoranes.

Tienen adaptaciones de vuelo eficientes para cubrir grandes distancias. Algunas especies son conocidas por sus vuelos migratorios de larga distancia.

Aves playeras

En cuanto a las aves playeras, también conocidas como limícolas, suelen habitar en zonas intermareales, como playas, marismas, estuarios y áreas de lodo. Pasan mucho tiempo en la costa pero también pueden encontrarse en ambientes de agua dulce.

Se alimentan principalmente de invertebrados acuáticos, como gusanos, crustáceos y moluscos, que encuentran en la arena o el lodo. Suelen alimentarse en la zona intermareal durante las mareas bajas.

Muchas aves playeras anidan en tierra, a menudo en nidos poco profundos en el suelo. Algunas especies también anidan en áreas de tundra o pastizales.

Tienen picos especializados para sondear y atrapar presas pequeñas en el suelo o el agua. Sus patas suelen ser largas y adaptadas para caminar en terrenos pantanosos.

En resumen, la principal diferencia radica en sus hábitats y comportamientos alimenticios.

Mientras que las aves marinas se centran en hábitats oceánicos y tienen adaptaciones para vuelos de larga distancia, las aves playeras se especializan en ambientes costeros y zonas intermareales, centrándose en la búsqueda de invertebrados en el suelo o el agua.

Cargando Artículo siguiente ...
Fin de los artículos

OTRAS NOTICIAS

Incendios forestales amenazan supervivencia humana

Los incendios forestales han arrasado vastas extensiones de...

Colombia arde en llamas

Luis Ángel Muñoz Zúñiga Especial
Diario Occidente Colombia arde en...

Vea por qué se presentan las altas temperaturas

Los expertos en cambio climático manifiestan que es la primera vez...

Altas temperaturas en Colombia en 2024: calor rom...

Colombia enfrenta un fenómeno climático sin precedentes en 2024,...

Colombia refuerza política sobre el plástico

Con el fin de avanzar en el manejo sostenible del plástico Colombia se...

Vida silvestre volvió a su hábitat

Más de 300 liberaciones de fauna silvestre se realizaron en el Pacífico...

