



Buscar

Enviar

Comentar

Compartir

ESPECIES INVASORAS

MEDIO AMBIENTE

La historia del cangrejo invasor que la CAR pide no consumir en Semana Santa



Esta especie llegó a Colombia en 1985.

FOTO: CAR Cundinamarca

El cangrejo rojo americano (*Procambarus clarkii*) se ha expandido rápidamente en la región.



EDWIN CAICEDO

marzo 26 de 2024, 09:10 A.M.

+ Ver Más

Unirse a whatsapp

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) hizo esta semana un llamado a los habitantes de los municipios ubicados en la cuenca alta del río Bogotá Valle de Ubaté para que se abstengan de consumir cangrejo rojo americano (*Procambarus clarkii*), también conocido como langostilla de río, cangrejo de pantano rojo o cangrejo de Louisiana, una especie invasora con efectos negativos en la salud humana y cuya presencia altera los ecosistemas y puede afectar especies nativas como el cangrejo sabanero.

Temas Relacionados

MEDIO AMBIENTE ENERO 29 DE 2024

Por sequía en el río Magdalena bebé manatí quedó varado y tuvo que ser rescatado



BOGOTÁ ENERO 29 DE 2024

CAR va a iniciar una evaluación técnica y científica de zonas afectadas por incendios



OTRAS CIUDADES ENERO 27 DE 2024

Así es vivir en Jerusalén, el municipio de Colombia 'más caliente que el infierno'



BOGOTÁ ENERO 20 DE 2024

Ante estado de los embalses, Acueducto toma medidas para enfrentar fenómeno de El Niño



BOGOTÁ

Piden con ra Bogotá Cundin





(Lea también: [Especies invasoras: un problema mundial que varía por el carisma](#))

El llamado de la autoridad ambiental no solo se da como antesala a la Semana Santa, época en la que se incrementa el consumo y venta de pescado y otras especies que hacen parte de la gastronomía tradicional religiosa, sino además por la presencia de estos individuos en lugares de esparcimiento y recreación como los parques ecoturísticos de la CAR ubicados en estas zonas, ante el riesgo que para adultos, menores de edad y mascotas representaría su manipulación o ingesta.

El cangrejo rojo americano mide entre 10,5 y 12 centímetros, pesa alrededor de 45 gramos. Su cuerpo tiene forma cilíndrica cuyo color en edad adulta es de un rojo intenso y algunas veces toma tonalidades cafés. Es una especie con una alta tasa de fecundidad que alcanza a poner entre 200 y 500 huevos y su reproducción es altamente **resistente a aguas de mala calidad y bajas concentraciones de oxígeno.**

La CAR enfatizó que cuenta con información técnica suficiente y detallada para generar alertas tempranas que permitan frenar los impactos sobre las personas que por desconocimiento la consuman o los animales que de manera instintiva la ingieran como cualquier otro alimento.

(Lea también: [Especies invasoras en Colombia: ¿cuáles son las más peligrosas?](#))

El cangrejo rojo americano: un extranjero indeseable

Esta especie llegó a Colombia en 1985 proveniente de Estados Unidos con fines de investigación como parte de un proyecto particular en el municipio de Palmira, Valle, pero fue liberada de forma accidental y desde entonces se ha expandido rápidamente a otras zonas del país.

Los análisis realizados por la CAR a partir de trabajo de campo y fuentes secundarias dan cuenta de la presencia de este crustáceo en por lo menos 8 municipios ubicados en el valle de Ubaté, particularmente en la laguna de Fúquene, así como algunas zonas pantanosas y humedales de la cuenca alta del río Bogotá.

Esta especie puede afectar seriamente el equilibrio natural de las zonas que habita, pues **es vector de diferentes virus y enfermedades letales para otras especies de cangrejos nativos** por la cantidad de patógenos y parásitos que alberga en su cuerpo.

(Lea también: [Especies invasoras han contribuido con el 60 % de las extinciones del mundo](#))





Compartir     

Se sabe además que si una persona o un animal doméstico (gato o perro), **come uno de estos crustáceos puede llegar a presentar complicaciones en vías digestivas y respiratorias de consecuencias severas y a veces letales.**

El riesgo aumenta si se tiene en cuenta que este cangrejo tiene alta adaptación en aguas contaminadas y su capacidad de generar alteraciones en poblaciones de especies nativas es alta. Adicionalmente, sus hábitos de propagación en madrigueras que instalan en orificios en las paredes de los cuerpos de agua, alteran y modifican los ecosistemas acuáticos.

Por todo ello, la Corporación Ambiental puntualizó que su nuevo Plan de Acción Cuatrienal se busca fomentar las líneas de investigación, conocimiento, educación, control y manejo de esta especie, lo cual requiere de la participación de varios actores institucionales y de la propia comunidad para detener de manera efectiva el crecimiento de poblaciones de cangrejo rojo americano en la jurisdicción.

“Invitamos a las autoridades municipales, sanitarias y a la comunidad de los municipios ubicados en las cuencas alta y media del río Bogotá y el río Suárez a apoyar las acciones de la CAR evitando por cualquier medio alimentar, manipular, capturar o consumir cangrejo rojo americano y a reportar de manera oportuna la presencia de alguno de estos animales en la zona.”, afirmó el director de Innovación de la CAR, Julio César Pulido Puerto.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUROS | @ELTIEMPOVERDE

[RELACIONADOS](#) | [ESPECIE INVASORA](#) | [ESPECIES INVASORAS](#) | [ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS](#) | [CANGREJO](#) | [CAR CUNDINAMARCA](#) | [CAR](#)

 Reciba noticias de EL TIEMPO desde Google News

 **EDWIN CAICEDO**
marzo 26 de 2024, 09:10 A.M.

   
Comentar Guardar Reportar Portada

Artículos en tendencia



Presidente Petro anuncia que rompería relaciones con Is...

 70 comentarios



Israel responde a Petro: "Su apoyo a Hamás es una vergü...

 29 comentarios



Gobierno Petro rompe su silencio frente a negación a la...

 19 comentarios



Ecopetrol: el impedimento en transición energética de Á...

 5 comentarios



'El presidente quiere quitar al Congreso del camino de ...

 22 comentarios

Conversación

SEGUIR

CERRAR SESIÓN



Inicie la conversación, Intermedios S.A.S

TODOS LOS COMENTARIOS

LOS MÁS RECIENTES  