



HASTA **30%**

con Avis o Budget comprando en
www.rfgrentacar.com del 25 de
febrero al 3 de marzo.

Ri

RESERVA AHORA

AI


QUEMAS QUE SE SALEN DE CONTROL SERÍA LA CAUSA

Más de 10 mil incendios se han reportado en la Amazonia durante la última semana

Medio Ambiente 28 Feb 2019 - 10:42 AM

Por: -Redacción Medio Ambiente

Aunque resulte una cifra alarmante, los focos de calor son inferiores a los reportados durante el mismo periodo en 2018. Ideam insiste en evitar las quemaduras en esta época, bajo las condiciones del Fenómeno de El Niño.





Desde el 20 de febrero, los satélites han registrado 10.824 focos de calor en la Amazonia colombiana.
/ Sistema de Monitoreo de Incendios Sinchi

Gracias a los sistemas de monitoreo de incendios en el país es posible saber en tiempo real dónde nace el fuego, si se extiende sobre amplias hectáreas, cuánto terreno arrasa y, luego, cuáles son las cicatrices que deja tras de sí. A partir de esos datos, logrados a través de satélites de la NASA, puede conocerse que durante la última semana (del 20 al 27 de febrero a las 6:00 a.m.) se presentaron en la **Amazonia colombiana** un total de 10.824 focos de calor. (Lea: **800 hectáreas de la Sierra Nevada de Santa Marta se están incendiando**)

Aunque la cifra parezca escandalosa, según el registro de datos que colecciona el **Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi)**, durante el mismo periodo de 2018 el número de focos de calor registrado es de 12.831. Esto quiere decir que, en comparación con el año pasado, esta temporada se presentaron 2.000 incendios menos.

Sobre estos eventos existe una causa principal de acuerdo con Uriel Murcia, coordinador del programa **Modelos de Funcionamiento del Sinchi**. "Se debe a las decisiones que toman los productores de quemar, ya sea las áreas recién deforestadas con el fin de prepararlas para sembrar cultivos de pan coger o pasto. O, por la quema de pasturas con el propósito de renovar y controlar plagas", explicó el experto.

El problema es que esta práctica, combinada con el asunto del clima, suele salirse de control. Porque a finales del mes de enero, durante todo febrero y principios de marzo es la época más seca en la región amazónica. Esto explica porque el fuego producido por los pobladores tiende a salirse de control y termina extendiéndose por áreas que no estaban previstas, creando emergencias en zonas protegidas como es el caso de la **Sierra La Macarena**.



IDEAMColombia

@IDEAMColombia

Directora del IDEAM hace un llamado a la comunidad para evitar las quemas agrícolas en esta época del año bajo las condiciones del Fenómeno de El Niño. Tenemos altas temperaturas del aire y fuertes vientos que nos pueden ayudar a propagar los incendios.[#NoALaQuemaAgrícola](#)

28 11:49 - 27 feb. 2019

[46 personas están hablando de esto](#)

Temas relacionados

Amazonia

Incendios Forestales

Investigaciones Científicas Sinchi

o Comentarios