

Cali, abril 15 de 2020.

Buscar

TEMAS DESTACADOS: [Encuesta de la semana](#) | [Edictos y Avisos de ley](#) | [Versión PDF](#) | [Nueva fecha Feria Esotérica 2020](#)

El felino cayó en una trampa puesta por cazadores en noviembre del año pasado

Tigrillo ocelote fue liberado por la CVC, tras periodo de recuperación



VALLE DEL CAUCA

Martes 14 de Abril, 2020

Una hembra adulta de ocelote -Leopardus pardalis- fue liberada la semana pasada por técnicos de la CVC e integrantes de la comunidad de El Danubio, en Dagua, tras la estancia del animal en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, CAV, de la CVC.

El felino fue hallado en dicha zona por la misma comunidad en una trampa lazo y fue entregado a funcionarios de la Corporación, que detallaron un sangrado en su miembro posterior izquierdo. De esta manera, la hembra de ocelote fue ingresada al CAV para valoración inmediata.

Según el reporte clínico, el animal fue recibido el 3 de noviembre de 2019 con “un peso de 9.700 gramos, evidencia de edema en miembro posterior izquierdo desde tibia distal hacia plantar y dos agujones de abeja en el dorso. Asimismo, su condición corporal, unida al bajo peso, mostró que estaba por debajo de los parámetros para la especie, según la edad y talla.

DIARIO OCCIDENTE

Cali, Miércoles 15 de abril de 2020

LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

Nº 8.851 ISSN 1659-8771

Aislamiento aumentó las facturas de los servicios

“Recursos se han ejecutado con transparencia”

Venezolanos vuelven a casa

Recomendaciones

Alíse de manera preventiva, evita el

La Vacuna Está En Tus Manos

Versión impresa en pdf

¡DESCARGALA AQUÍ!

Recibe las noticias en tu correo electrónico

DESTACADO

- LO MÁS VISTO

¿Qué va a pasar con el cobro de los servicios públicos?
- LO MÁS RECIENTE

Así funciona el pico y cédula en Jamundí
- Buga suspende procedimientos
- El día que el diablo se apareció en Juanchito: ¿Verdad o leyenda?
- ¿Se pueden tener relaciones sexuales durante la cuarentena?

Tras el tratamiento, para finales de diciembre de 2019 la inflamación del miembro cedió completamente y se realizaron pruebas de leptospira y toxoplasma que arrojaron resultados negativos, como parte del protocolo al que se somete a un animal que puede ser liberado.

Tras sesiones de rehabilitación física en un recinto con sustrato vegetal, plataformas y múltiples refugios, se evidenció un comportamiento tranquilo, pero de evasión hacia los cuidadores, lo que demostró que el felino tenía altas probabilidades de ser regresado al medio silvestre, pues no mostró una filiación hacia los humanos que lo hicieran perder los aprendizajes básicos instintivos para vivir en su hábitat por sí mismo.

Finalmente, **los expertos de la CVC determinaron realizar el proceso de liberación y fue la misma comunidad que lo halló la que apoyó en todo el recorrido y el transporte del guacal** donde estaba el animal, en medio de una zona de bosque húmedo de muy difícil acceso.

“La comunidad fue fundamental para que este animal continuara con vida, pues lo hallaron y coordinaron todo el proceso de entrega en medio de esta emergencia sanitaria, junto con la Alcaldía de Dagua, para que nuestros técnicos lo trasladaron sin inconvenientes al CAV. **Esto demuestra la alta conciencia de los pobladores de El Danubio y el compromiso en el manejo de la relación dada entre productividad y los recursos naturales.** Agradecemos también su apoyo en la logística para trasladar de nuevo al ocelote a la libertad, pues fueron ellos mismos quienes cargaron el pesado guacal en medio de una zona altamente boscosa”, expresó Gustavo Trujillo, biólogo de la CVC.

El dato

El ocelote es un felino de talla media que está presente desde México hasta Argentina, en ecosistemas por debajo de los 1.200 msnm, sin embargo, en Colombia puede ser hallado hasta los 2.000 msnm, inclusive, en zonas de páramo. **Es el tercer felino más grande de Colombia después del jaguar y el puma;** su piel es amarilla con puntos y rosetas negras, y vientre blanco.

Se puede reconocer fácilmente por sus rayas en el cuello y su cola corta, que apenas toca el suelo. Los pelos dorsales del cuello están en dirección anterior, contrario al resto del pelaje del cuerpo. Su color de fondo (amarillo) puede variar entre habano y naranja.

Es una especie de tigrillo de hábitos solitarios, terrestres y principalmente nocturno, alimentándose de cualquier animal que pueda acechar, atrapar y matar; prefiere roedores pequeños y medianos, además de aves, lagartos y culebras.

Vea el video:



Recibe la mejor información
en tu correo electrónico
Suscríbete a nuestro boletín
de noticias, sin costo.



PUBLICIDAD

